

Learning Temple

IIT/NEET ACADEMY

7th January 2020 _ SHIFT - 1

MATHEMATICS



1. Let $x^k + y^k = a^k$, ($a, k > 0$) and $\frac{dy}{dx} + \left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{1}{3}} = 0$, then k is:

यदि $x^k + y^k = a^k$, ($a, k > 0$) तथा $\frac{dy}{dx} + \left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{1}{3}} = 0$, तो k बराबर है :

(1) $\frac{2}{3}$

(2) $\frac{4}{3}$

(3) $\frac{3}{2}$

(4) $\frac{1}{3}$

Sol. 1

$$k \cdot x^{k-1} - k \cdot y^{k-1} \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\left(\frac{x}{y}\right)^{k-1}$$

$$\frac{dy}{dx} + \left(\frac{x}{y}\right)^{k-1} = 0$$

$$k - 1 = -\frac{1}{3}$$

$$k = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

2. Let α be a root of the equation $x^2 + x + 1 = 0$ and the matrix $A = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha^4 \end{bmatrix}$, then the matrix A^{31} is equal to

यदि समीकरण $x^2 + x + 1 = 0$ का एक मूल α है तथा आव्यूह $A = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha^4 \end{bmatrix}$ है, तो आव्यूह A^{31} बराबर है

(1) A

(2) A^3

(3) A^2

(4) I_3

Sol. 2

$$A^2 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^4 = I$$

$$\Rightarrow A^{31} = A^{28} \times A^3 = A^3$$

3. Let α and β be two real roots of the equation $(k + 1)\tan^2 x - \sqrt{2} \cdot \lambda \tan x = (1 - k)$, where $k(\neq -1)$ and λ are real numbers. if $\tan^2(\alpha + \beta) = 50$, then a value of λ is:

माना समीकरण $(k + 1)\tan^2 x - \sqrt{2} \cdot \lambda \tan x = (1 - k)$, $k(\neq -1)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ के α तथा β दो वास्तविक मूल हैं। यदि $\tan^2(\alpha + \beta) = 50$ है, तो λ का एक मान है -

(1) 5

(2) 10

(3) $10\sqrt{2}$

(4) $5\sqrt{2}$

Sol. 2

$$(k + 1) \tan^2 x - \sqrt{2}\lambda \tan x + (k - 1) = 0$$

$$\tan \alpha + \tan \beta = \frac{\sqrt{2}\lambda}{k+1}$$

$$\tan \alpha \times \tan \beta = \frac{k-1}{k+1}$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\frac{\sqrt{2}\lambda}{k+1}}{1 - \frac{k-1}{k+1}} = \frac{\sqrt{2}\lambda}{2} = \frac{\lambda}{\sqrt{2}}$$

$$\tan^2(\alpha + \beta) = \frac{\lambda^2}{2} = 50$$

$$\lambda = 10$$

- 4.** A vector $\vec{a} = \alpha\hat{i} + 2\hat{j} + \beta\hat{k}$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$) lies in the plane of the vectors, $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j}$ and $\vec{c} = \hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$. If \vec{a} bisects the angle between \vec{b} and \vec{c} , then:

एक सदिश $\vec{a} = \alpha\hat{i} + 2\hat{j} + \beta\hat{k}$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$) उस समतल में, जिसमें दोनों सदिश $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j}$ तथा $\vec{c} = \hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$ स्थित है, स्थित है। यदि \vec{a} सदिशों \vec{b} और \vec{c} के बीच के कोण को समद्विभाजित करता है तो :

$$(1) \vec{a} \cdot \hat{i} + 1 = 0$$

$$(2) \vec{a} \cdot \hat{k} + 2 = 0$$

$$(3) \vec{a} \cdot \hat{i} + 3 = 0$$

$$(4) \vec{a} \cdot \hat{k} + 4 = 0$$

Sol. 2

angle bisector can be $\vec{a} = \lambda(\vec{b} + \vec{c})$ or $\vec{a} = \mu(\vec{b} - \vec{c})$

$$\vec{a} = \lambda \left(\frac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}} + \frac{\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}}{3\sqrt{2}} \right) = \frac{\lambda}{3\sqrt{2}} [3\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}] = \frac{\lambda}{3\sqrt{2}} [4\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}]$$

compare with $\vec{a} = \alpha\hat{i} + 2\hat{j} + \beta\hat{k}$

$$\frac{2\lambda}{3\sqrt{2}} = 2 \Rightarrow \lambda = 3\sqrt{2}$$

$$\vec{a} = 4\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}$$

Not in option so now consider $\vec{a} = \mu \left(\frac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}} - \frac{\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}}{3\sqrt{2}} \right)$

$$\vec{a} = \frac{\mu}{3\sqrt{2}} (3\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{i} + \hat{j} - 4\hat{k})$$

$$= \frac{\mu}{3\sqrt{2}} (2\hat{i} + 4\hat{j} - 4\hat{k})$$

compare with $\vec{a} = \alpha \hat{i} + 2\hat{j} + \beta \hat{k}$

$$\frac{4\mu}{3\sqrt{2}} = 2 \Rightarrow \mu = \frac{3\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$$

$$\vec{a} \cdot \hat{k} + 2 = 0$$

5. If $\operatorname{Re}\left(\frac{z-1}{2z+i}\right) = 1$, where $z = x + iy$, then the point (x, y) lies on a:

यदि $\operatorname{Re}\left(\frac{z-1}{2z+i}\right) = 1$, जहाँ $z = x + iy$, तो बिन्दु (x, y) स्थित है :

(1) straight line whose slope is $\frac{3}{2}$.

(2) circle whose center is $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$.

(3) circle whose diameter is $\frac{\sqrt{5}}{2}$

(4) straight line whose slope is $-\frac{2}{3}$.

(1) एक सरल रेखा पर, जिसका ढाल $\frac{3}{2}$ है।

(2) एक वृत्त पर, जिसका केन्द्र बिन्दु $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$ है।

(3) एक वृत्त पर, जिसका व्यास $\frac{\sqrt{5}}{2}$ है।

(4) एक सरल रेखा पर, जिसका ढाल $-\frac{2}{3}$ है।

Sol. 3

$$z = x + iy$$

$$\left(\frac{z-1}{2z+i}\right) = \frac{(x-1)+iy}{2(x+iy)+i} = \frac{(x-1)+iy}{2x+(2y+1)i} \times \frac{2x-(2y+1)i}{2x-(2y+1)i}$$

$$\operatorname{Re}\left(\frac{z+1}{2z+i}\right) = \frac{2x(x-1)+y(2y+1)}{(2x)^2+(2y+1)^2} = 1$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 2y^2 - 2x + y = 4x^2 + 4y^2 + 4y + 1$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 2y^2 + 2x + 3y + 1 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - x + \frac{3}{2}y + \frac{1}{2} = 0$$

Circle with center $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}\right)$

$$r = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{9}{16} - \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{4+9-8}{16}} = \frac{\sqrt{5}}{4}$$

6. Total number of 6-digit numbers in which only and all the five digits 1, 3, 5, 7 and 9 appear, is:

छ: अंकों वाली सभी संख्याओं की कुल संख्या जिनमें केवल तथा सभी पाँच अंक 1, 3, 5, 7 और 9 ही हों, है:

(1) $\frac{1}{2}(6!)$

(2) $6!$

(3) $\frac{5}{2}(6!)$

(4) 5^6

Sol. 3

1, 3, 5, 7, 9

For digit to repeat we have 5C_1 choices

and six digits can be arranged in $\frac{6!}{2}$ ways.

Hence total such numbers = $\frac{5!}{2} = \frac{5 \cdot 4!}{2}$

7. If $y = mx + 4$ is a tangent to both the parabolas, $y^2 = 4x$ and $x^2 = 2by$, then b is equal to:

यदि $y = mx + 4$ दोनो परवलयों, $y^2 = 4x$ तथा $x^2 = 2by$ को स्पर्श करती है, तो b बराबर है :

(1) 128 (2) -32 (3) -128 (4) -64

Sol. 3

$$y = mx + 4 \quad \dots(i)$$

$$y^2 = 4x \text{ tangent } y = mx + \frac{a}{m} \Rightarrow y = mx + \frac{1}{m} \quad \dots(ii)$$

from (i) and (ii)

$$4 = \frac{1}{m} \Rightarrow m = \frac{1}{4}$$

So line $y = \frac{1}{4}x + 4$ is also tangent to parabola $x^2 = 2by$, so solve

$$x^2 = 2b \left(\frac{x+16}{4} \right) \Rightarrow 2x^2 - bx - 16b = 0 \Rightarrow d = 0$$

$$\Rightarrow b^2 - 4 \times 2 \times (-16b) = 0 \Rightarrow b^2 + 32 \times 4b = 0$$

$$b = -128, b = 0 \text{ (not possible)}$$

8. If the distance between the foci of an ellipse is 6 and the distance between its directrices is 12, then the length of its latus rectum is:

यदि एक दीर्घवृत्त की नाभियों के बीच की दूरी 6 है तथा इसकी नियताओं के बीच की दूरी 12 है, तो इसकी नाभिलम्ब जीवा की लम्बाई है :

(1) $3\sqrt{2}$

(2) $2\sqrt{3}$

(3) $\frac{3}{\sqrt{2}}$

(4) $\sqrt{3}$

Sol. 1

$$2ae = 6 \quad \text{and} \quad \frac{2a}{e} = 12$$

$$\Rightarrow ae = 3 \quad \text{and} \quad \frac{a}{e} = 6$$

$$\Rightarrow a^2 = 18$$

$$\Rightarrow b^2 = a^2 - a^2e^2 = 18 - 9 = 9$$

$$\Rightarrow \text{L.R.} = \frac{2b^2}{a} = \frac{2 \times 9}{3\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$$


9. The area of the region, enclosed by the circle $x^2 + y^2 = 2$ which is not common to the region bounded by the parabola $y^2 = x$ and the straight line $y = x$, is:

वक्त $x^2 + y^2 = 2$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का वह क्षेत्रफल जो परवलय $y^2 = x$ तथा सरल रेखा $y = x$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में नहीं है, है

- (1) $\frac{1}{3}(6\pi - 1)$ (2) $\frac{1}{6}(12\pi - 1)$ (3) $\frac{1}{3}(12\pi - 1)$ (4) $\frac{1}{6}(24\pi - 1)$

Sol. 2

Total area - enclosed area



$$2\pi - \int_0^1 [\sqrt{x} - x] dx$$

$$2\pi - \left(\frac{2x^{3/2}}{3} - \frac{x^2}{2} \right)_0^1$$

$$2\pi - \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right) \Rightarrow 2\pi - \left(\frac{1}{6} \right) \Rightarrow \frac{12\pi - 1}{6}$$

10. An unbiased coin is tossed 5 times. Suppose that a variable X is assigned the value of k when k consecutive heads are obtained for $k = 3, 4, 5$, otherwise X takes the value -1 . Then the expected value of X , is:

एक अनभिन्न सिक्के को पाँच बार उछाला जाता है। माना, एक चर X को, $k = 3, 4, 5$ के लिए, मान k दिया जाता है जब सिक्के पर क्रमागत k चित आएँ तथा अन्य सभी स्थितियों में X का मान -1 है, तो X का अपेक्षित मान है।

- (1) $\frac{1}{8}$ (2) $-\frac{3}{16}$ (3) $\frac{3}{16}$ (4) $-\frac{1}{8}$

Sol. 1

K	0	1	2	3	4	5
P(k)	$\frac{1}{32}$	$\frac{12}{32}$	$\frac{11}{32}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{2}{32}$	$\frac{1}{32}$

k = no. of times head occur consecutively
now expected value is

$$= \sum xP(k) = (-1) \times \frac{1}{32} + (-1) \times \frac{12}{32} + (-1) \times \frac{11}{32} + 3 \times \frac{5}{32} + 4 \times \frac{2}{32} + 5 \times \frac{1}{32} = \frac{1}{8}$$

- 11.** Let the function, $f: [-7, 0] \rightarrow \mathbb{R}$ be continuous on $[-7, 0]$ and differentiable on $(-7, 0)$. If $f(-7) = -3$ and $f'(x) \leq 2$, for all $x \in (-7, 0)$, then for all such functions f , $f(-1) + f(0)$ lies in the interval:
 माना फलन $f: [-7, 0] \rightarrow \mathbb{R}$, $[-7, 0]$ पर संतत है तथा $(-7, 0)$ पर अवकलनीय है। यदि $f(-7) = -3$ और सभी $x \in (-7, 0)$ के लिए, $f'(x) \leq 2$ है, तो ऐसे सभी फलनों f के लिए $f(-1) + f(0)$ जिस अन्तराल में है, वह है :
 (1) $(-\infty, 20]$ (2) $[-3, 11]$ (3) $(-\infty, 11]$ (4) $[-6, 20]$

Sol. 1

Lets use LMVT for $x \in [-7, -1]$

$$\frac{f(-1) - f(-7)}{(-1 + 7)} \leq 2$$

$$\frac{f(-1) + 3}{6} \leq 2 \Rightarrow f(-1) \leq 9$$

Also use LMVT for $x \in [-7, 0]$

$$\frac{f(0) - f(-7)}{(0 + 7)} \leq 2$$

$$\frac{f(0) + 3}{7} \leq 2 \Rightarrow f(0) \leq 11$$

$$\therefore f(0) + f(-1) \leq 20$$

- 12.** The greatest positive integer k , for which $49^k + 1$ is a factor of the sum $49^{125} + 49^{124} + \dots + 49^2 + 49 + 1$, is:
 सबसे बड़ी धन पूर्णांक संख्या k , जिसके लिए $49^k + 1$ योगफल $49^{125} + 49^{124} + \dots + 49^2 + 49 + 1$, का एक गुणखंड है, है :

- (1) 32 (2) 63 (3) 60 (4) 65

Sol. 2

$$\frac{(49)^{126} - 1}{48} = \frac{((49)^{63} + 1)(49^{63} - 1)}{48}$$

- 13.** If $g(x) = x^2 + x - 1$ and $(g \circ f)(x) = 4x^2 - 10x + 5$, then $f\left(\frac{5}{4}\right)$ is equal to:

यदि $g(x) = x^2 + x - 1$ तथा $(g \circ f)(x) = 4x^2 - 10x + 5$, तो $f\left(\frac{5}{4}\right)$ बराबर है :

- (1) $-\frac{1}{2}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) $-\frac{3}{2}$ (4) $\frac{1}{2}$

Sol. 1

$$g(f(x)) = f^2(x) + f(x) - 1$$

$$g\left(f\left(\frac{5}{4}\right)\right) = 4\left(\frac{5}{4}\right)^2 - 10 \cdot \frac{5}{4} + 5 = \frac{-5}{4}$$

$$g\left(f\left(\frac{5}{4}\right)\right) = f^2\left(\frac{5}{4}\right) + f\left(\frac{5}{4}\right) - 1$$

$$-\frac{5}{4} = f^2\left(\frac{5}{4}\right) + f\left(\frac{5}{4}\right) - 1$$

$$f^2\left(\frac{5}{4}\right) + f\left(\frac{5}{4}\right) + \frac{1}{4} = 0$$

$$\left(f\left(\frac{5}{4}\right) + \frac{1}{2}\right)^2 = 0$$

$$f\left(\frac{5}{4}\right) = -\frac{1}{2}$$

- 14.** Let P be a plane passing through the points (2, 1, 0), (4, 1, 1) and (5, 0, 1) and R be any point (2, 1, 6). Then the image of R in the plane P is:

यदि एक समतल P तीन बिन्दुओं (2, 1, 0), (4, 1, 1) और (5, 0, 1) से होकर जाता है, तथा कोई और बिन्दु R (2, 1, 6) है, तो समतल P में R का प्रतिबिम्ब (image) है :

- (1) (6, 5, -2) (2) (4, 3, 2) (3) (6, 5, 2) (4) (3, 4, -2)

Sol. 1

$$\text{Plane is } x + y - 2z = 3 \Rightarrow \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-6}{-2} = \frac{-2(2+1-12-3)}{6}$$

$$\Rightarrow (x, y, z) = (6, 5, -2)$$

- 15.** If $f(a + b + 1 - x) = f(x)$, for all x , where a and b are fixed positive real numbers, then

$$\frac{1}{a+b} \int_a^b x(f(x) + f(x+1))dx \text{ is equal to:}$$

यदि सभी x के लिए, $f(a + b + 1 - x) = f(x)$ है, जबकि a तथा b स्थिर (fixed) धन वास्तविक संख्याएँ हैं, तो

$$\frac{1}{a+b} \int_a^b x(f(x) + f(x+1))dx \text{ बराबर है :}$$

- (1) $\int_{a-1}^{b-1} f(x)dx$ (2) $\int_{a+1}^{b+1} f(x)dx$ (3) $\int_{a-1}^{b-1} f(x+1)dx$ (4) $\int_{a+1}^{b+1} f(x+1)dx$

Sol. 3

$$I = \frac{1}{(a+b)} \int_a^b x[f(x) + f(x+1)]dx \quad \dots(i)$$

$$x \rightarrow a + b - x$$

$$I = \frac{1}{(a+b)} \int_a^b (a+b-x)[f(a+b-x) + f(a+b+1-x)]dx$$

$$I = \frac{1}{(a+b)} \int_a^b (a+b-x)[f(x+1) + f(x)]dx \quad \dots(ii)$$

[\therefore put $x \rightarrow x + 1$ in given equation]

(i) + (ii)

$$2I = \int_a^b [f(x+1) + f(x)] dx$$

$$2I = \int_a^b f(x+1) dx + \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_a^b f(a+b+1-x) dx + \int_a^b f(x) dx$$

$$2I = 2 \int_a^b f(x) dx$$

16. If the system of linear equations

$$2x + 2ay + az = 0$$

$$2x + 3by + bz = 0$$

$$2x + 4cy + cz = 0,$$

where $a, b, c \in \mathbb{R}$ are non-zero distinct; has a non-zero solution, then:

(1) $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ are in A.P.

(2) $a + b + c = 0$

(3) a, b, c are in A.P.

(4) a, b, c are in G.P.

यदि निम्न रैखिक समीकरण निकाय

$$2x + 2ay + az = 0$$

$$2x + 3by + bz = 0$$

$$2x + 4cy + cz = 0,$$

जहाँ a, b , तथा c विभिन्न शून्येतर वास्तविक संख्याएँ हैं का एक शून्येतर हल है, तो :-

(1) $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ समान्तर श्रेणी में है।

(2) $a + b + c = 0$

(3) a, b, c समान्तर श्रेणी में है।

(4) a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में है।

Sol. 1

For non - trivial solution

$$\begin{vmatrix} 2 & 2a & a \\ 2 & 3b & b \\ 2 & 4c & c \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2a & a \\ 1 & 3b & b \\ 1 & 4c & c \end{vmatrix} = 0$$

$$(3bc - 4bc) - (2ac - 4ac) + (2ab - 3ab) = 0$$

$$-bc + 2ac - ab = 0$$

a, b, c in H.P.

$$\Rightarrow \frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c} \text{ are in A.P.}$$

17. If $y(\alpha) = \sqrt{2\left(\frac{\tan \alpha + \cot \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}\right) + \frac{1}{\sin^2 \alpha}}$, $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$, then $\frac{dy}{d\alpha}$ at $\alpha = \frac{5\pi}{6}$ is:

यदि $y(\alpha) = \sqrt{2\left(\frac{\tan \alpha + \cot \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}\right) + \frac{1}{\sin^2 \alpha}}$, $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$, है, तो $\alpha = \frac{5\pi}{6}$ पर $\frac{dy}{d\alpha}$ का मान है :

- (1) $\frac{4}{3}$ (2) -4 (3) 4 (4) $-\frac{1}{4}$

Sol. 3

$$y = \sqrt{\frac{2 \cos^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} + \frac{1}{\sin^2 \alpha}} = \sqrt{2 \cot \alpha + \operatorname{cosec}^2 \alpha} = |1 + \cot \alpha| = -1 - \cot \alpha$$

$$\frac{dy}{d\alpha} = \operatorname{cosec}^2 \alpha \Rightarrow \left(\frac{dy}{d\alpha}\right)_{\alpha = \frac{5\pi}{6}} \text{ will be } = 4$$

18. If $y = y(x)$ is the solution of the differential equation, $e^y \left(\frac{dy}{dx} - 1\right) = e^x$ such that $y(0) = 0$, then $y(1)$ is equal to:

यदि अवकलन समीकरण, $e^y \left(\frac{dy}{dx} - 1\right) = e^x$, जबकि $y(0) = 0$, का हल $y=y(x)$ है, तो $y(1)$ बराबर है:

- (1) $1 + \log_e 2$ (2) $\log_e 2$ (3) $2 + \log_e 2$ (4) $2e$

Sol. 1

$$e^y = t$$

$$e^y \frac{dy}{dx} = \frac{dt}{dx}$$

$$\frac{dt}{dx} - t = e^x$$

$$\text{IF} = e^{\int -1 dx} = e^{-x}$$

$$t(e^{-x}) = \int e^x \cdot e^{-x} dx$$

$$e^{y-x} = x + c$$

$$\text{Put } x = 0, y = 0 \text{ then } C = 1$$

$$e^{y-x} = x + 1$$

$$y = x - \log(x + 1)$$

$$\text{at } x = 1, y = 1 + \log_e(2)$$

19. The logical statement $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow \sim p)$ is equivalent to:

तर्कसंगत कथन $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow \sim p)$ निम्न कथनों में से किसके तुल्य है ?

- (1) p (2) q (3) $\sim p$ (4) $\sim q$

Sol. 3

p	q	$p \rightarrow q$	$\sim p$	$q \rightarrow \sim p$	$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \sim q)$
T	T	T	F	F	F
T	F	F	F	T	F
F	T	T	T	T	T
F	F	T	T	T	T

Clearly $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \sim p)$ is equivalent to $\sim p$

- 20.** Five numbers are in A.P. whose sum is 25 and product is 2520. If one of these five numbers is $-\frac{1}{2}$, then the greatest number amongst them is:

पाँच संख्याएँ समान्तर श्रेणी में हैं, जिनका योगफल 25 तथा गुणनफल 2520 है। यदि इन पाँच संख्याओं में से एक $-\frac{1}{2}$ है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है

- (1) 16 (2) 7 (3) $\frac{21}{2}$ (4) 27

Sol. 1

Let terms be $a - 2d, a, a - d, a + d, a + 2d$
 sum = 25 $\Rightarrow 5a = 25 \Rightarrow a = 5$
 product = 2520
 $(5 - 2d)(5 - d) + 5(5 + d)(5 + 2d) = 2520$
 $\Rightarrow (25 - 4d^2)(25 - d^2) = 504$
 $\Rightarrow 625 - 100d^2 - 25d^2 + 4d^4 = 504$
 $\Rightarrow 4d^4 - 125d^2 + 121 = 0$
 $\Rightarrow 4d^4 - 121d^2 - 4d^2 + 121 = 0$
 $\Rightarrow (d^2 - 1)(4d^2 - 121) = 0$

$$\Rightarrow d = \pm 1, \quad d = \pm \frac{11}{2}$$

$d = \pm 1$, does not give $-\frac{1}{2}$ as a term

$$\therefore d = \frac{11}{2}$$

$$\therefore \text{largest term} = 5 + 2d = 5 + 11 = 16$$

- 21.** If the sum of the coefficients of all even powers of x in the product $(1 + x + x^2 + \dots + x^{2n})(1 - x + x^2 - x^3 + \dots + x^{2n})$ is 61, then n is equal to _____.

यदि गुणनफल $(1 + x + x^2 + \dots + x^{2n})(1 - x + x^2 - x^3 + \dots + x^{2n})$ में, x के सभी समघातों वाले गुणांकों का योगफल 61 है, तो n बराबर है _____.

Sol. 30

Sol. 30

Let $(1 - x + x^2 - \dots)(1 + x + x^2 - \dots) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$

Put $x = 1$

$$1(2n + 1) = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{2n} \quad \dots(i)$$

put $x = -1$

$$(2n + 1) \times 1 = a_0 - a_1 + a_2 - \dots + a_{2n} \quad \dots(ii)$$

Form (i) and (ii)

$$4n + 2 = 2(a_0 + a_2 + \dots)$$

$$= 2 \times 61$$

$$\Rightarrow 2n + 1 = 61 \Rightarrow n = 30$$

22. Let S be the set of points where the function, $f(x) = |2-|x-3||$, $x \in \mathbb{R}$ is not differentiable. Then $\sum_{x \in S} f(f(x))$ is equal to _____.

यदि S उन सभी बिन्दुओं का समुच्चय है, जिनके लिए फलन, $f(x) = |2-|x-3||$, $x \in \mathbb{R}$ अवकलनीय नहीं है, तो $\sum_{x \in S} f(f(x))$ बराबर है _____.

Sol. 3
 $\therefore f(x)$ is non differentiable at $x = 1, 3, 5$
 $\sum f(f(x)) = f(f(1)) + f(f(3)) + f(f(5))$
 $= 1 + 1 + 1$
 $= 3$

23. Let $A(1, 0)$, $B(6, 2)$ and $C\left(\frac{3}{2}, 6\right)$ be the vertices of a triangle ABC . If P is a Point inside the triangle ABC such that the triangles APC , APB and BPC have equal areas, then the length of the line segment PQ , where Q is the point $\left(-\frac{7}{6}, -\frac{1}{3}\right)$, is _____.

माना $A(1, 0)$, $B(6, 2)$ तथा $C\left(\frac{3}{2}, 6\right)$, एक त्रिभुज ABC के शीर्ष बिन्दु है। यदि एक बिन्दु P , ΔABC के अन्दर इस प्रकार

है, कि त्रिभुजों APC , APB और BPC के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो रेखाखण्ड PQ , जबकि बिन्दु $Q\left(-\frac{7}{6}, -\frac{1}{3}\right)$ है, की लम्बाई है _____.

Sol. 5
 P will be centroid of ΔABC
 $P = \left(\frac{17}{6}, \frac{8}{3}\right) \Rightarrow PQ = \sqrt{\left(\frac{24}{6}\right)^2 + 3^2}$
 $= 5$

24. If the variance of the first n natural numbers is 10 and the variance of the first m even natural numbers is 16, then $m + n$ is equal to _____.

यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का प्रसरण 10 है और प्रथम m सम-प्राकृत संख्याओं का प्रसरण 16 है, तो $m+n$ बराबर है _____.

Sol. 18
 $\text{var}(1, 2, \dots, n) = 10 \Rightarrow \frac{1^2+2^2+\dots+n^2}{n} - \left(\frac{1+2+\dots+n}{n}\right)^2 = 10$
 $\Rightarrow \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 = 10$
 $\Rightarrow n^2 - 1 = 120 \Rightarrow n = 11$
 $\text{var}(2, 4, 6, \dots, 2m) = 16 \Rightarrow \text{var}(1, 2, \dots, m) = 4$
 $\Rightarrow m^2 - 1 = 48 \Rightarrow m = 7 \Rightarrow m + n = 18$

25. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3^x + 3^{3-x} - 12}{3^{-x/2} - 3^{1-x}}$ is equal to _____.

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3^x + 3^{3-x} - 12}{3^{-x/2} - 3^{1-x}}$ बराबर है _____.

Sol. 72

Put $3^{\frac{x}{2}} = t$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\frac{4t^2}{3} - 12}{-\frac{3}{t^2} + \frac{1}{t}} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{4(t^2 - 9)t^2}{3(-3 + t)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{4t^2(3 + t)}{3} = \frac{4 \times 9 \times 6}{3} = 72$$