

**9<sup>th</sup> January 2020 \_ SHIFT - II**

---

**MATHEMATICS**

---



1. In the expansion of  $\left(\frac{x}{\cos\theta} + \frac{1}{x\sin\theta}\right)^{16}$ , if  $I_1$  is the least value of the term independent of  $x$  when

$\frac{\pi}{8} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$  and  $I_2$  is the least value of the term independent of  $x$  when  $\frac{\pi}{16} \leq \theta \leq \frac{\pi}{8}$ , then the ratio  $I_2 : I_1$  is equal to :

$\left(\frac{x}{\cos\theta} + \frac{1}{x\sin\theta}\right)^{16}$  के प्रसार में, यदि  $x$  से स्वतंत्र पद का निम्नतम मान  $I_1$  है जब  $\frac{\pi}{8} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$  तथा  $x$  से स्वतंत्र पद का

निम्नतम मान  $I_2$  है जब  $\frac{\pi}{16} \leq \theta \leq \frac{\pi}{8}$ , तो अनुपात  $I_2 : I_1$  बराबर है :

- (1) 1 : 16                      (2) 8 : 1                      (3) 1 : 8                      (4) 16 : 1

**Sol. 4**

$$T_9 = {}^{16}C_8 \left(\frac{x}{\cos\theta}\right)^8 \left(\frac{1}{x\sin\theta}\right)^8 = {}^{16}C_8 \left(\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}\right)^8$$

$$\Rightarrow \frac{{}^{16}C_8 \cdot 2^8}{(\sin 2\theta)^8}$$

$$\text{if } \theta \in \left[\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}\right] \quad \therefore 2\theta \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$l_1 = {}^{16}C_8 \cdot 2^8$$

$$\text{if } \theta \in \left[\frac{\pi}{16}, \frac{\pi}{8}\right] \quad \therefore 2\theta \in \left[\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}\right]$$

$$l_2 = \frac{{}^{16}C_8 \cdot 2^8}{(1/\sqrt{2})^8} = {}^{16}C_8 \cdot 2^8 \cdot 2^4$$

$$\frac{l_2}{l_1} = 2^4 = (16 : 1)$$

2. Let a function  $f : [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}$  be continuous  $f(1) = 3$  and  $F$  be defined as :

$$F(x) = \int_1^x t^2 g(t) dt, \text{ where } g(t) = \int_1^t f(u) du$$

Then for the function  $F$ , the point  $x = 1$  is :

- (1) a point of inflection                      (2) a point of local minima  
(3) not a critical point.                      (4) a point of local maxima

माना एक फलन  $f : [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}$  संतत है,  $f(1) = 3$  है तथा  $F, F(x) = \int_1^x t^2 g(t) dt$ , द्वारा परिभाषित है, जहाँ  $g(t) =$

$$\int_1^t f(u) du$$

है, तो फलन  $F$  के लिए, बिन्दु  $x = 1$  एक :

- (1) क्रांतिक बिन्दु नहीं है।
- (2) स्थानीय निम्निष्ठ बिन्दु है।
- (3) नति परिवर्तन (inflection) बिन्दु है।
- (4) स्थानीय उच्चिष्ठ बिन्दु है।

**Sol. 2**

$$F(x) = \int_1^x t^2 g(t) dt$$

$$g(t) = \int_1^x f(u) du$$

$$F'(x) = x^2 \cdot g(x)$$

$$g'(t) = f(t)$$

$$F'(1) = 1 \cdot g(1) = 0$$

$$F''(x) = 2xg(x) + x^2 \cdot f(x)$$

$$F''(1) = 2g(1) + f(1) = 0 + 3 = 3$$

Local Minima

- 3.** Let  $[t]$  denote the greatest integer  $\leq t$  and  $\lim_{x \rightarrow 0} x \left\lfloor \frac{4}{x} \right\rfloor = A$ . Then the function,  $f(x) = [x^2] \sin(\pi x)$  is discontinuous, when  $x$  is equal to :

माना  $[t]$  महत्तम पूर्णांक  $\leq t$  को दर्शाता है तथा  $\lim_{x \rightarrow 0} x \left\lfloor \frac{4}{x} \right\rfloor = A$  है। तो फलन  $f(x) = [x^2] \sin(\pi x)$  असंतत है, जब  $x$  बराबर है :

$$(1) \sqrt{A+21}$$

$$(2) \sqrt{A+1}$$

$$(3) \sqrt{A+5}$$

$$(4) \sqrt{A}$$

**Sol. 2**

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \left( \frac{4}{x} - \left\lfloor \frac{4}{x} \right\rfloor \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( 4 - x \left\lfloor \frac{4}{x} \right\rfloor \right)$$

$$4 - 0 \times \text{finite}$$

$$A = 4$$

$$f(n) = [x^2] \sin(\pi x)$$

In option 1, 3, 4 values are integer and Integral Multiple of  $\pi$  in sine is always zero.

$\therefore f(x)$  is disc. at  $\sqrt{A+1}$

4. If  $A = \{x \in \mathbb{R} : |x| < 2\}$  and  $B = \{x \in \mathbb{R} : |x - 2| \geq 3\}$ ; then :  
 यदि  $A = \{x \in \mathbb{R} : |x| < 2\}$  तथा  $B = \{x \in \mathbb{R} : |x - 2| \geq 3\}$ , तो :
- (1)  $A - B = [-1, 2)$   
 (2)  $B - A = \mathbb{R} - (-2, 5)$   
 (3)  $A \cap B = (-2, -1)$   
 (4)  $A \cup B = \mathbb{R} - (2, 5)$


**Sol. 2**

$$A = \{x \in (-2, 2)\}$$

$$B = \{|x - 2| \geq 3\}$$

$$\Rightarrow x - 2 \geq 3 \cup x - 2 \leq -3$$

$$x \geq 5 \cup x \leq -1$$



5. Let  $a_n$  be the  $n^{\text{th}}$  term of a G.P. of positive terms. If  $\sum_{n=1}^{100} a_{2n+1} = 200$  and  $\sum_{n=1}^{100} a_{2n} = 100$ , then

$$\sum_{n=1}^{200} a_n \text{ is equal to :}$$

माना धनात्मक पदों की एक गुणोत्तर श्रेणी का  $n$  वां पद  $a_n$  है। यदि  $\sum_{n=1}^{100} a_{2n+1} = 200$  तथा  $\sum_{n=1}^{100} a_{2n} = 100$ , तो  $\sum_{n=1}^{200} a_n$

बराबर है :

(1) 175

(2) 225

(3) 300

(4) 150

**Sol. 4**

$$\sum_{n=1}^{100} a_{2n+1} = 200$$

$$a_3 + a_5 + \dots + a_{201} = 200$$

$$a_2 + a_4 + \dots + a_{200} = 100$$

So

$$ar^2 + ar^4 + \dots + ar^{200} = 200$$

$$ar^2(1 + r^2 + \dots + r^{198}) = 200 \quad \dots(i)$$

and

$$ar + ar^3 + \dots + ar^{199} = 100$$

$$ar(1 + r^2 + \dots + r^{198}) = 100 \quad \dots(ii)$$

$$\sum_{n=1}^{200} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{200}$$

$$= a + ar + \dots + ar^{199}$$

$$\Rightarrow a \frac{\{r^{200} - 1\}}{r - 1}$$

using eq. (i)

$$a \cdot 2 \frac{\{2^{200} - 1\}}{3} = 100$$

$$a (2^{100} - 1) = 150$$

$$a = \frac{150}{2^{200} - 1}$$

$$\sum_{n=1}^{200} a_n = \frac{150}{2^{200} - 1} \times (2^{200} - 1) = 150$$

6. If 10 different balls are to be placed in 4 distinct boxes at random, then the probability that two of these boxes contain exactly 2 and 3 balls is :

यदि 10 भिन्न गेंदों, 4 भिन्न बक्सों में यादच्छया रखी जानी है, तो इनमें से दो बक्सों में मात्र 2 तथा 3 गेंदों के होने की प्रायिकता है :

(1)  $\frac{965}{2^{11}}$

(2)  $\frac{965}{2^{10}}$

(3)  $\frac{945}{2^{10}}$

(4)  $\frac{945}{2^{11}}$

**Sol. 3**

$$\frac{10C_5 \times \frac{5!}{2!3!} \times 4^4 C_2 \times 2^5}{4^{10}} = \frac{3780}{2^{12}} = \frac{945}{2^{10}}$$

7. If  $\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2 + y^2}$  ;  $y(1) = 1$  ; then a value of  $x$  satisfying  $y(x) = e$  is :

यदि  $\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2 + y^2}$  ;  $y(1) = 1$  है, तो  $y(x) = e$  को सन्तुष्ट करने वाला  $x$  का एक मान है :

(1)  $\sqrt{2} e$

(2)  $\frac{1}{2} \sqrt{3} e$

(3)  $\sqrt{3} e$

(4)  $\frac{e}{\sqrt{2}}$

**Sol. 3**

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

$$y = vx$$

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$$

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{vx^2}{x^2 + v^2x^2} = \frac{1 - v - v^3}{1 + v^2}$$

$$\frac{(1 + v^2)dv}{v^3} = - \frac{dx}{x}$$

$$-\frac{1}{2v^2} + \ell n v = -\ell n x + C$$

$$a + y = e$$

$$-\frac{x^2}{2y^2} = -\ell n x + C$$

$$\therefore x = \sqrt{3} e$$

$$x = 1, y = 1$$

$$\therefore C = -\frac{1}{2}$$

8. The following system of linear equations

$$7x + 6y - 2z = 0$$

$$3x + 4y + 2z = 0$$

$$x - 2y - 6z = 0, \text{ has}$$

(1) Infinitely many solutions,  $(x, y, z)$  satisfying  $y = 2z$ .

(2) Infinitely many solutions,  $(x, y, z)$  satisfying  $x = 2z$ .

(3) No solutions

(4) Only the trivial solution.

निम्नलिखित रेखिय समीकरणों

$$7x + 6y - 2z = 0$$

$$3x + 4y + 2z = 0$$

$$x - 2y - 6z = 0, \text{ की निकाय रखती है}$$

(1) अनन्त रूप से कई हल,  $(x, y, z)$  है जो  $y = 2z$  को सन्तुष्ट करते हैं।

(2) अनन्त रूप से कई हल,  $(x, y, z)$  है जो  $x = 2z$  को सन्तुष्ट करते हैं।

(3) कोई हल नहीं

(4) केवल तुच्छ (trivial) हल

Sol. 2

$$\begin{vmatrix} 7 & 6 & -2 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & -2 & -6 \end{vmatrix} = 0$$

$$7\{-24 + 4\} - 6\{-18 - 2\} - 2\{-6, -4\}$$

$$\Delta = -140 + 120 + 20 = 0$$

Also  $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$  are zero

Infinite Solutions

from equation (i) + 3 equation (iii)

$$10x - 20z = 0$$

$$x = 2z.$$

9. Let  $a, b \in \mathbb{R}$   $a \neq 0$  be such that the equation,  $ax^2 - 2bx + 5 = 0$  has a repeated root  $\alpha$ , which is also a root of the equation,  $x^2 - 2bx - 10 = 0$ . If  $\beta$  is the other root of this equation, then  $\alpha^2 + \beta^2$  is equal to :

माना  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$  इस प्रकार हैं कि समीकरण  $ax^2 - 2bx + 5 = 0$  का  $\alpha$  पुनरावृत्त मूल है, जो समीकरण

$x^2 - 2bx - 10 = 0$  का भी एक मूल है। यदि  $\beta$  इस समीकरण का दूसरा मूल है, तो  $\alpha^2 + \beta^2$  बराबर है :

(1) 24

(2) 25

(3) 26

(4) 28

Sol. 2

$$ax^2 - 2bx + 5 = 0 \begin{matrix} \nearrow \alpha \\ \searrow \alpha \end{matrix}$$

$$4b^2 - 4a \cdot 5 = 0$$

$$x^2 - 2bx - 10 = 0 \begin{matrix} \nearrow \alpha \\ \searrow \beta \end{matrix}$$

$$b^2 = 5a$$

$$a\alpha^2 - 2b\alpha + 5 = 0$$

$$\alpha^2 - 2b\alpha - 10 = 0$$

$$\begin{array}{r} - \quad + \quad \quad \quad + \\ \hline \end{array}$$

$$(a - 1)\alpha^2 + 15 = 0$$

$$(a - 1)5a + 15a^2 = 0$$

$$20a^2 - 5a = 0$$

$$5a(4a - 1) = 0$$

$$a = \frac{1}{4} \quad \therefore b^2 = \frac{5}{4}$$

$$\alpha + \beta = 2b$$

$$\alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta = 4b^2 = 5$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = 5 - 2(-10) = 25$$

- 10.** The length of the minor axis (along  $y$  - axis) of an ellipse in the standard form is  $\frac{4}{\sqrt{3}}$ . If this ellipse touches the lines,  $x + 6y = 8$ , then its eccentricity is :

मानक रूप में एक दीर्घवत्त के लघु अक्ष ( $y$  - अक्ष के अनुदिश) की लम्बाई  $\frac{4}{\sqrt{3}}$  है। यदि दीर्घवत्त, रेखा  $x + 6y = 8$  को

स्पर्श करता है, तो इसकी उत्केन्द्रता है :

(1)  $\frac{1}{3}\sqrt{\frac{11}{3}}$

(2)  $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{5}{3}}$

(3)  $\sqrt{\frac{5}{6}}$

(4)  $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{11}{3}}$

**Sol. 4**

$$2b = \frac{4}{\sqrt{3}} \Rightarrow b = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$y = -\frac{x}{6} + \frac{4}{3} \Rightarrow mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$$

$$m = -\frac{1}{6}$$

$$a^2m^2 + \frac{4}{3} = \frac{16}{9} \Rightarrow a^2 = 16$$

$$e^2 = 1 - \frac{4/3}{16} = 1 - \frac{1}{12} \Rightarrow e = \sqrt{\frac{11}{12}}$$

- 11.** If one end of a focal chord AB of the parabola  $y^2 = 8x$  is at  $A\left(\frac{1}{2}, -2\right)$ , then the equation of the tangent to it at B is :

यदि परवलय  $y^2 = 8x$  की एक नाभि जीवा AB का एक छोर  $A\left(\frac{1}{2}, -2\right)$  पर है, तो B पर इसकी स्पर्श-रेखा का समीकरण

है :

- (1)  $x - 2y + 8 = 0$   
 (2)  $2x + y - 24 = 0$   
 (3)  $x + 2y + 8 = 0$   
 (4)  $2x - y - 24 = 0$

**Sol. 1**

$$y^2 = 8x \quad A\left(\frac{1}{2}, -2\right)$$

$$a = 2$$

$$t_1 t_2 = -1$$

$$t_2 = 2$$

$$4t_1 = -2$$

$$t_1 = -1/2$$

$$\therefore B(8, 8)$$

$$\therefore 8y = 4(x + 8)$$

$$2y = x + 8$$

$$x - 2y + 8 = 0$$

- 12.** Given :  $f(x) = \begin{cases} x & , 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & , x = \frac{1}{2} \\ 1-x & , \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$  and  $g(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2, x \in \mathbb{R}$ . Then the area (in sq. units) of

the region bounded by the curve,  $y = f(x)$  and  $y = g(x)$  between the lines,  $2x = 1$  and  $2x = \sqrt{3}$ , is :

$$\text{दिया है : } f(x) = \begin{cases} x & , 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & , x = \frac{1}{2} \\ 1-x & , \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases} \quad \text{तथा } g(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2, x \in \mathbb{R} \text{ तो रेखाओं } 2x = 1 \text{ तथा } 2x = \sqrt{3} \text{ के}$$

बीच, वक्रों  $y = f(x)$  तथा  $y = g(x)$  द्वारा प्रतिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों में) है :

(1)  $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4}$


(2)  $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}$

(3)  $\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4}$

(4)  $\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{3}$

**Sol. 4**





$$\text{Required area} = \text{Area of trapezium ABCD} - \int_{1/2}^{\sqrt{3}/2} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} + 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \frac{1}{3} \left[\left(x - \frac{1}{2}\right)^3\right]_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{3}$$

**13.** If  $p \rightarrow (p \wedge \sim q)$  is false, then the truth values of  $p$  and  $q$  are respectively :  
यदि  $p \rightarrow (p \wedge \sim q)$  असत्य है, तो  $p$  तथा  $q$  के क्रमशः सत्यमान हैं :

- (1) T, F
- (2) T, T
- (3) F, F
- (4) F, T

**Sol. 2**

$p$	$q$	$\sim q$	$p \wedge \sim q$	$p \rightarrow (p \wedge \sim q)$
T	T	F	F	F
T	F	T	T	T
F	T	F	F	T
F	F	T	F	T

- 14.** If  $z$  be a complex number satisfying  $|\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)| = 4$ , then  $|z|$  cannot be :  
 यदि  $z$  एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है जो  $|\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)| = 4$  को सन्तुष्ट करती है, तो  $|z|$  नहीं हो सकता :

- (1)  $\sqrt{7}$                       (2)  $\sqrt{10}$                       (3)  $\sqrt{8}$                       (4)  $\sqrt{\frac{17}{2}}$

**Sol. 1**

$$z = x + iy$$


$$|x| + |y| = 4$$

$$\text{Minimum value of } |z| = 2\sqrt{2}$$

$$\text{Maximum value of } |z| = 4$$

$$|z| \in [\sqrt{8}, \sqrt{16}]$$

So  $|z|$  can't be  $\sqrt{7}$



- 15.** Let  $f$  and  $g$  be differentiable function on  $\mathbb{R}$  such that  $f \circ g$  is the identity function. If for some  $a$ ,  $b \in \mathbb{R}$   $g'(a) = 5$  and  $g(a) = b$ , then  $f'(b)$  is equal to :

माना  $\mathbb{R}$  पर अवकलनीय फलन  $f$  तथा  $g$  इस प्रकार है कि  $f \circ g$  तत्समक फलन है। यदि किसी  $a, b, \in \mathbb{R}$  के लिए  $g'(a) = 5$  तथा  $g(a) = b$  हैं, तो  $f'(b)$  बराबर है :

- (1) 5                      (2)  $\frac{1}{5}$                       (3)  $\frac{2}{5}$                       (4) 1

**Sol. 2**

$$f(g(x)) = x$$

$$f'(g(x)) \cdot g'(x) = 1$$

$$x = a$$

$$f'(g(a)) \cdot g'(a) = 1$$

$$f'(b) = 1/5$$

- 16.** If  $\int \frac{d\theta}{\cos^2 \theta (\tan 2\theta + \sec 2\theta)} = \lambda \tan \theta + 2 \log_e |f(\theta)| + C$  where  $C$  is a constant of integration, then the ordered pair  $(\lambda, f(\theta))$  is equal to :

यदि  $\int \frac{d\theta}{\cos^2 \theta (\tan 2\theta + \sec 2\theta)} = \lambda \tan \theta + 2 \log_e |f(\theta)| + C$  है, जहाँ  $C$  एक समाकलन अचर है, तो क्रमित युग्म

$(\lambda, f(\theta))$  बराबर है :

- (1)  $(1, 1+\tan\theta)$                       (2)  $(-1, 1+\tan\theta)$                       (3)  $(-1, 1-\tan\theta)$                       (4)  $(1, 1-\tan\theta)$

**Sol. 2**

$$\int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\left( \frac{2 \tan \theta}{-\tan^2 \theta} + \frac{1 + \tan^2 \theta}{1 - \tan^2 \theta} \right)}$$

$$\Rightarrow \int \frac{\sec^2 \theta (1 - \tan^2 \theta) d\theta}{(1 + \tan \theta)^2}$$

$$\Rightarrow \int \frac{\sec^2 \theta (1 - \tan^2 \theta) d\theta}{(1 + \tan \theta)}$$

$$\tan \theta = t$$

$$\int \frac{1-t}{1+t} dt = \int -1 + \frac{2}{1+t} dt$$

$$= -t + 2 \ln(1+t) + C$$

$$= -\tan \theta + 2 \log(1 + \tan \theta) + C$$

$$\Rightarrow \lambda = -1 \text{ and } f(x) = 1 + \tan \theta$$

**17.** A random variable X has the following probability distribution :

X	:	1	2	3	4	5
P(X)	:	K <sup>2</sup>	2K	K	2K	5K <sup>2</sup>

Then P(X > 2) is equal to :

एक यादच्छिक चर X का प्रायिकता बंटन निम्न है :

X	:	1	2	3	4	5
P(X)	:	K <sup>2</sup>	2K	K	2K	5K <sup>2</sup>

तो P(X > 2) बराबर है :

(1)  $\frac{1}{36}$

(2)  $\frac{7}{12}$

(3)  $\frac{23}{36}$

(4)  $\frac{1}{6}$

**Sol. 3**

$$\sum p_i = 1 \Rightarrow 6k^2 + 5k = 1$$

$$6k^2 + 5k - 1 = 0$$

$$6k^2 + 6k - k - 1 = 0$$

$$(6k - 1)(k + 1) = 0$$

$$\Rightarrow k = -1 (\text{rejected}) ; k = \frac{1}{6}$$

$$p(x > 2) = k + 2k + 5k^2$$

$$= \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{5}{36} = \frac{6 + 12 + 5}{36} = \frac{23}{36}$$

**18.** Let  $a - 2b + c = 1$ . If  $f(x) = \begin{vmatrix} x+a & x+2 & x+1 \\ x+b & x+3 & x+2 \\ x+c & x+4 & x+3 \end{vmatrix}$ , then :

माना  $a - 2b + c = 1$  है। यदि  $f(x) = \begin{vmatrix} x+a & x+2 & x+1 \\ x+b & x+3 & x+2 \\ x+c & x+4 & x+3 \end{vmatrix}$  है, तो :

(1)  $f(-50) = 501$

(2)  $f(50) = 1$

(3)  $f(-50) = -1$

(4)  $f(50) = -501$

**Sol. 2**

$$\text{Apply } R_1 = R_1 + R_3 - 2R_2$$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x+b & x+3 & x+2 \\ x+c & x+4 & x+3 \end{vmatrix} \Rightarrow f(x) = 1 \Rightarrow f(50) = 1$$

**19.** If  $x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \tan^{2n} \theta$  and  $y = \sum_{n=0}^{\infty} \cos^{2n} \theta$ , for  $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ , then :

यदि  $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$  के लिए  $x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \tan^{2n} \theta$  तथा  $y = \sum_{n=0}^{\infty} \cos^{2n} \theta$  हैं, तो :

$$(1) x(1-y) = 1 \quad (2) y(1-x) = 1 \quad (3) y(1+x) = 1 \quad (4) x(1+y) = 1$$

**Sol. 2**

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \tan^{2n} \theta$$

$$= 1 - \tan^2 \theta + \tan^4 \theta - \dots$$

$$x = \frac{1}{1 + \tan^2 \theta} \Rightarrow x = \cos^2 \theta$$

$$y = 1 + \cos^2 \theta + \cos^4 \theta + \dots$$

$$= \frac{1}{1 - \cos^2 \theta} = \sec^2 \theta$$

$$\therefore y(1-x) = \sec^2 \theta (1 - \cos^2 \theta) = 1$$

**20.** If  $x = 2 \sin \theta - \sin 2\theta$  and  $y = 2 \cos \theta - \cos 2\theta$ ,  $\theta \in [0, 2\pi]$ , then  $\frac{d^2y}{dx^2}$  at  $\theta = \pi$  is :

यदि  $x = 2 \sin \theta - \sin 2\theta$  तथा  $y = 2 \cos \theta - \cos 2\theta$ ,  $\theta \in [0, 2\pi]$  हैं, तो  $\theta = \pi$  पर  $\frac{d^2y}{dx^2}$  का मान है :

$$(1) \frac{3}{2}$$

$$(2) \frac{3}{4}$$

$$(3) -\frac{3}{8}$$

$$(4) -\frac{3}{4}$$

**Sol.**  $\frac{dy}{d\theta} = -2 \sin \theta + 2 \sin 2\theta$ ,  $\frac{dx}{d\theta} = 2 \cos \theta - 2 \cos 2\theta$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin 2\theta - \sin \theta}{\cos \theta - \cos 2\theta} = \frac{2 \cos \frac{3\theta}{2} \cdot \sin \frac{\theta}{2}}{2 \sin \frac{3\theta}{2} \cdot \sin \frac{\theta}{2}}$$

$$= \cot \frac{3\theta}{2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\operatorname{cosec}^2 \frac{3\theta}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{d\theta}{dx} \Rightarrow \frac{-3/2}{-2-2} = \frac{3}{8} \quad \text{[No Ans. Matching]}$$

- 21.** Let  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  and  $\vec{c}$  be three vectors such that  $|\vec{a}| = \sqrt{3}$ ,  $|\vec{b}| = 5$ ,  $\vec{b} \cdot \vec{c} = 10$  and the angle between  $\vec{b}$  and  $\vec{c}$  is  $\frac{\pi}{3}$ . If  $\vec{a}$  is perpendicular to the vector  $\vec{b} \times \vec{c}$ , then  $|\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})|$  is equal to \_\_\_\_\_.

माना तीन सदिश  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  तथा  $\vec{c}$  इस प्रकार है कि  $|\vec{a}| = \sqrt{3}$ ,  $|\vec{b}| = 5$ ,  $\vec{b} \cdot \vec{c} = 10$  तथा  $\vec{b}$  और  $\vec{c}$  के बीच का कोण  $\frac{\pi}{3}$  है।

यदि  $\vec{a}$ , सदिश  $\vec{b} \times \vec{c}$  पर लम्बवत है, तो  $|\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})|$  बराबर है \_\_\_\_\_।

**Sol. 30**

$$\vec{b} \cdot \vec{c} = 10$$

$$\Rightarrow |\vec{b}| |\vec{c}| \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 10 \Rightarrow 5 \cdot |\vec{c}| \cdot \frac{1}{2} = 10 \Rightarrow |\vec{c}| = 4$$

$$\text{Also, } \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 0$$

$$|\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})| = |\vec{a}| |\vec{b} \times \vec{c}| \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\sqrt{3} \times |\vec{b}| |\vec{c}| \sin\frac{\pi}{3} \times 1 = \sqrt{3} \times 5 \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 30$$

- 22.** If the curves,  $x^2 - 6x + y^2 + 8 = 0$  and  $x^2 - 8y + y^2 + 16 - k = 0$ , ( $k > 0$ ) touch each other at a point, then the largest value of  $k$  is \_\_\_\_\_.

यदि वक्र  $x^2 - 6x + y^2 + 8 = 0$  तथा  $x^2 - 8y + y^2 + 16 - k = 0$ , ( $k > 0$ ) एक दूसरे को एक बिन्दु पर स्पर्श करते हैं, तो  $k$  अधिकतम मान है.....।

**Sol. 36**

Two circle touches each other if  $C_1 C_2 = |r_1 \pm r_2|$

Distance between  $C_2(3,0)$  and  $C_1(0,4)$  is either  $\sqrt{k} + 1$  or  $|\sqrt{k} - 1|$  ( $C_1 C_2 = 5$ )

$$\Rightarrow \sqrt{k} + 1 = 5 \text{ or } |\sqrt{k} - 1| = 5 \Rightarrow k = 16 \text{ or } k = 36$$

- 23.** If the distance between the plane,  $23x - 10y - 2z + 48 = 0$  and the plane containing the lines

$$\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z+1}{3} \text{ and } \frac{x+3}{2} = \frac{y+2}{6} = \frac{z-1}{\lambda} (\lambda \in \mathbb{R})$$

is equal to  $\frac{k}{\sqrt{633}}$ , then  $k$  is equal to

$$\text{यदि समतल } 23x - 10y - 2z + 48 = 0 \text{ तथा रेखाओं } \frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z+1}{3} \text{ और } \frac{x+3}{2} = \frac{y+2}{6} = \frac{z-1}{\lambda} (\lambda \in \mathbb{R})$$

को अंतर्विष्ट करने वाले समतल के बीच की दूरी  $\frac{k}{\sqrt{633}}$  है, तो  $k$  बराबर है.....।

**Sol. 3**

distance between  $(-1, 3, 1)$  and Plane

$$\text{is } \left| \frac{-23 - 30 + 2 + 48}{\sqrt{23^2 + 10^2 + 2^2}} \right| = \frac{3}{\sqrt{633}}$$

$$k = 3$$

**24.** The number of terms common to the two A.P.'s  $3, 7, 11, \dots, 407$  and  $2, 9, 16, \dots, 709$  is  
दो समांतर श्रेणियों  $3, 7, 11, \dots, 407$  तथा  $2, 9, 16, \dots, 709$  में उभयनिष्ठ (common) पदों की संख्या है.....।

**Sol. 14**

$$3, 7, 11, \dots, 407 \quad d = 4$$

$$2, 9, 16, \dots, 709 \quad d = 7$$

$$1^{\text{st}} \text{ term common of both series} = 23$$

$$c.d = 28$$

$$407 = 23 + (n - 1) 28$$

$$\frac{384}{28} + 1 = n$$

$$n = 14.$$

**25.** If  $C_r = {}^{25}C_r$  and  $C_0 + 5.C_1 + 9.C_2 + \dots + (101) . C_{25} = 2^{25}.k$ , then  $k$  is equal to \_\_\_\_\_.

यदि  $C_r = {}^{25}C_r$  तथा  $C_0 + 5.C_1 + 9.C_2 + \dots + (101) . C_{25} = 2^{25}.k$ , तो  $k$  बराबर है \_\_\_\_\_ ।

**Sol. 51**

$$\sum_{r=0}^{25} (4r + 1) {}^{25}C_r = 4 \sum_{r=0}^{25} r \cdot {}^{25}C_r + \sum_{r=0}^{25} {}^{25}C_r$$

$$= 4 \sum_{r=1}^{25} r \times \frac{25}{r} {}^{24}C_{r-1} + 2^{25} = 100 \sum_{r=1}^{25} {}^{24}C_{r-1} + 2^{25}$$

$$= 100 \cdot 2^{24} + 2^{25} = 2^{25}(50 + 1) = 51 \cdot 2^{25}$$